

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

Aude Gard Hérault Lozère Pyrénées Orientales

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41 42

ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de recettes de la D.D.A

C.C.P. Montpellier 5238-57

22 AVRIL 1982

Destiné aux agriculteurs du LAURAGAIS

AVERTISSEMENT N° 3

(rédigé en collaboration avec la ferme de LOUDES, les GVA  
les CIVAM de l'Aude et l'ITCF)

La dernière tournée du réseau céréales se solde par la visite de 210 champs.

TRAITEZ

## .- LES BLES SUR TOUS SECTEURS

- . lorsqu'ils ont atteint le stade 9 (dernière feuille étalée)
- et s'ils présentent de la ROUILLE BRUNE sur les deux ou trois dernières feuilles de de l'extrémité (voir schéma)

Les variétés les plus concernées par cet avis sont :

CASTAN, CATON, TALENT, DARIUS, ROAZON (semis précoce), FIDEL, HARDY (région Tarn).

INTERVENEZ avec :

- . Tilt C, à raison de 1 litre/hectare
- cette spécialité est à préférer s'il y a présence de septoriose avec la rouille brune.
- . ou Vigil K, à raison de 1,25 litre/hectare
- si rouille brune seule.

Dans les deux cas, le volume de bouillie doit être de 500 litres à l'hectare.

## .- LES POIS PROTEAGINEUX

L'antracnose est présente sur toutes les cultures. Traitez avec PELTAR à raison de 4 kilos à l'hectare.

Rajouter Pirimor G à raison de 0,500 kilos à l'hectare si vous décelez des colonies de pucerons.

-00000-

725

# SURVEILLEZ

## . - LES CEREALES

Recherchez les foyers de ROUILLE JAUNE. Surveillez-la. Préparez-vous à intervenir en cas de progression sur les étages foliaires supérieurs. Les prochains avertissements vous indiqueront la conduite à tenir.

La septoriose : observable dans de nombreuses situations, peut devenir dangereuse si elle monte sur les feuilles supérieures. Vérifier sa présence éventuelle dans vos cultures et sa localisation. ATTENDRE NOS PROCHAINS AVIS.

## . - LES COLZAS


Recherchez les colonies de pucerons ; le seuil d'intervention est de 2 colonies par mètre carré (moyenne sur l'ensemble de la parcelle).

En cas de nécessité *Pirimor G* à 500 grammes de produit commercial à l'hectare.

-00000-

# NE TRAITÉZ PAS

SI VOS CULTURES NE SONT PAS AUX SEUILS  
INDIQUES DANS LES RUBRIQUES CI-DESSUS.



STADE DE DEVELOPPEMENT DU BLE

ECHELLE DE FEEKES

D'après E. C. LARGE